



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ

SZEMÉSZETI OSZTÁLY

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.

Tel.: 34/515-488, Fax: 34/317-025

www.tatabanyakorhaz.hu



HÁTSÓ LENCSETOK LÉZERKEZELÉSE (CAPSULOTOMIA)

Név:

TAJ:

A hátsó lencsetok átlátszatlanává válása (fibrozisa) a modern szürkehályogműtét egyik leggyakoribb, késői szövődménye. Előfordulási gyakorisága a műtét után egy évvel 2-16%, öt év múlva 34-40% is lehet. Elhárítására a címben megjelölt, fájdalommentes lézeres kezelés szolgál.

A hátsó lencsetok YAG lézeres kezeléséről szemész orvos dönt és a kezelést is szemész orvos végzi. A kezelés ülő testhelyzetben, réslámpás nagyítás mellett történik. A YAG lézeres capsulotomia-t műtéti beavatkozásnak tekintik, ritkán lehetnek korai és késői szövődményei. Korai szövődmények: szaruhártyavizenyő, csarnokvérzés, a műlencse sérülése, szemnyomás-emelkedés. Késői szövődmények: ideghártya-vizenyő, sárgafolt-vizenyő, ideghártya-leválás.

A szövődmények listája minden műtétípus esetében hosszú és a beteg számára ijesztő komplikációkat tartalmazó felsorolás. A felsorolt szövődmények mindegyike előfordult már a világban a szóban forgó műtét után, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy egyformán gyakoriak, és hogy az Ön esetében mind egyformán valószínű. Kérjük, az Ön egyedi esetével kapcsolatos kockázatról konzultáljon a műtétet végző orvossal vagy kérdezze meg osztályos kezelőorvosát.

Teljes körű tájékoztatást kaptam egészségi állapotomról, a szükséges kezelésről; ezen információk birtokában hozzájárulok a szükséges beavatkozáshoz az esetleges szükséges módosításokkal együtt.

Kijelentem, hogy minden előttem ismert betegségről és panaszomról kezelőorvosomat tájékoztattam.

Beteg (törvényes képviselő) aláírása:.....

Orvos aláírása:.....

Dátum: